

NAZOGASTRİK SONDA İLE HASTAYI BESLEME BECERİSİ ÖĞRENİM REHBERİ

Kişisel Bilgiler

Ad – Sovad : Öğrenci Numarası :
Uygulama Tarihleri :
Uygulama :

- Yetersiz:** Basamağın hiç uygulanmaması ya da sırasında, doğru uygulanmaması.
- Geliştirilmesi Gerekir:** Basamağın doğru ve sırasında uygulanması, fakat eksikliklerin olması, eğiticinin hatırlatmasına gerek duyulması.
- Yeterli:** Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve sırasında uygulanması.

İşlem Sırası	İşlem Basamakları	1	2	3	4	5
1.	Hastaya kendini tanıtmak					
2.	Hastanın kimliğini kontrol etme					
3.	Hastaya yapılacak işlemi açıklama					
4.	Elleri yıkama					
5.	Malzemeleri hazırlama					
6.	Hastanın nazogastrik sonda ile beslenmeye uygunluk durumunu değerlendirme					
7.	Hastayı beslemeden önce beslenme solüsyonunun miktarı, içeriği ve sıklığının doğruluğunu kontrol etme					
8.	Beslenme solüsyonu ve beslenme setini hazırlama					
9.	Hastanın mahremiyetini sağlama					
10.	Hastaya Fowler's / Semi-Fowler's pozisyonu verme					
11.	Eldivenleri giyme					
12.	Kateterin distal ucundaki kılıfı çıkarma					
13.	Kateterin midede olup olmadığının kontrol etme					
14.	Rezidüel volümü tespit etme ve kaydetme					
15.	Mide içeriğini geri verme					
Enjektörle bolus ya da aralıklı beslenme yapılacaksa;						
16.	Enjektörün pistonunu çıkarma ve besleme tüpünün uç kısmına enjektörü yerleştirme					
17.	Enjektörü belirlenen miktarda beslenme solüsyonu ile doldurma					
18.	Enjektörü hastanın midesinden 30-45 cm yüksekte olacak şekilde tutma ve yer çekiminin etkisi ile beslenme solüsyonunun akışını sağlama					
19.	Beslenme seti ile aralıklı beslenme yapılıyorsa beslenme torbasını solüsyon ile doldurma ve klemp ile solüsyonun akış hızını ayarlama					
20.	Solüsyon bittikten sonra hastaya 30-60 ml su verme					
Sürekli besleme yapılacaksa;						
21.	Kateterin ucunu beslenme setinin ucu ile birleştirme					
22.	Beslenme setini beslenme pompasına yerleştirme					
23.	Solüsyonun akış hızını ayarlama ve beslenmeye başlama					
24.	Hastaya 4-6 saatte bir 30-60 ml su verme					
25.	Beslenme işlemi bittikten sonra hastanın Fowler's ya da başın en az 30° yukarıda kalacak şekilde sağ lateral pozisyonda kalmasını sağlama					
26.	Malzemeleri ortamdaki uzaklaştırma					
27.	Eldivenleri çıkarma					
28.	Hastaya rahat bir pozisyon verme					
29.	Elleri yıkama					
30.	Yapılan işlemi ve gözlemleri kaydetme					